

An Investigation of the Relationship Between Social Support and Mental Health Addicted Women

Zeinab Khorsandi: MA student of counseling, department of counseling Khatam university, Tehran, Iran.
zeinabkhorsandi@yahoo.com

Simin Hosseiniyan*: Professor, department of counseling, faculty of education and psychology Alzahra university, Tehran, Iran. hosseins1381@yahoo.com

Anahita Khodabakhshi Koolaei: Assistant professor, department of counseling, faculty of human science, Khatam university, Tehran, Iran. anna_khodabakhshi@yahoo.com

Abstract

Introduction: Drug abuse in most of times leads to psychological and social problems in addicted women. These problems not only affect addict women individual life but also affect society and family. The present study aimed to investigate the relationship between social support and mental health in addicted women.

Methods: The study population included all drug addicted women referred to three camps (Marham, Behbood gostaran hamgam and charity Kosar) Under the auspices of Social Welfare and Drug Headquarters in Tehran in April of 1395. The sample size of 150 people were available for sampling.

General Health Questionnaire (GHQ) and social support (Fleming) was completed by sample population. Pearson correlation and multiple regression was performed and data analysis was done using spss software.

Results: Results showed that social support had a significant and direct relationship with mental health Based on the results of the regression coefficient the most important role on mental health is the responsibility of the components of social support from friends. Public health scores declined with increased social support, the general health status improves.

Conclusions: According to the results, it can be concluded that Social support for addicted women can have a significant impact on mental health and social functioning. Therefore, it is essential to have a strategic planning and social networks should be considered for addicted women.

Keywords

Social Support

Mental Health

Addicted Women

Please cite this
article as follows:

Khorsandi Z, Hosseiniyan S, Khodabakhshi Koolaei A. An investigation of the relationship between social support and mental health addicted women. Quarterly journal of social work. 2017; 6 (3); 05-13

*Corresponding Author

Study Type: Original

Received: 15 Oct 2016

Accepted: 16 May 2017

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان زنان معتاد

زینب خرسندی: کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه خاتم، تهران، ایران. zeinabkhorsandi@yahoo.com

سیمین حسینیان*: استاد گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. hosseins1381@yahoo.com

آناهیتا خدابخشی کولایی: استادیار گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی دانشگاه خاتم، تهران، ایران. anna_khodabakhshi@yahoo.com

واژگان کلیدی

حمایت اجتماعی

سلامت روان

زنان معتاد

جکیده

مقدمه: با توجه به اینکه مصرف مواد مخدر در زنان، اغلب با آسیب‌های روانی و اجتماعی توأم است، گرفتاری زنان در اعتیاد نه تنها فرد و اجتماع بلکه فرزندان خانواده را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان زنان معتاد انجام گرفت.

روش: طرح این پژوهش توصیفی و به روش همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان معتاد به مواد مخدر مراجعه کننده به سه کمپ مرهم، بهبود گستران همگام و موسسه خیریه کوثر تحت نظارت سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۵ بودند، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس صدو پنجاه نفر به دست آمد. افراد نمونه پرسشنامه‌های سلامت عمومی (GHQ) و حمایت اجتماعی (فلمنگ) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS به روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام گرفت.

نتایج: یافته‌ها نشان داد که حمایت اجتماعی با سلامت روان رابطه معنی‌دار و مستقیم دارد و بر اساس نتایج ضریب رگرسیون بیشترین نقش و تبیین روی سلامت روان بر عهده مولفه حمایت اجتماعی از طرف دوستان می‌باشد. با افزایش میزان حمایت اجتماعی نمره سلامت عمومی کاهش یافته یعنی وضعیت سلامت عمومی بهبود می‌یابد.

بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل می‌توان عنوان کرد افزایش حمایت اجتماعی زنان معتاد می‌تواند تأثیر مهمی بر سلامت روان و عملکرد اجتماعی آنان داشته باشد لذا ضروری است که در برنامه‌ریزی‌های کلان نیازها و شبکه اجتماعی زنان معتاد مورد توجه قرار گیرند.

* نویسنده مسئول

نوع مطالعه: پژوهش

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶

مقدمه

اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات جوامع بشری است که نه تنها موجب اختلالات رفتاری و اجتماعی می‌گردد، بلکه با تأثیر بر جنبه‌های مختلف سلامت جسمی، خسارات مالی هنگفتی بر فرد، خانواده و جامعه وارد می‌سازد.^(۱) اعتیاد زنان عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و نابسامانی‌های خانوادگی و فردی است. پدیده اعتیاد و بهویژه گسترش روزافزوں وابستگی و اعتیاد به مواد جدید با توجه به تأثیرات روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی، خانواده و جامعه را تهدید می‌کند و به رفتارهای آسیب‌زاوی مانند تنش در نقش‌های خانوادگی، ولگردی و خیابان‌گردی، تکدیگری، کجروی و در موارد حاد به انحراف جنسی و خودفروشی منجر می‌شود. از این رو می‌توان اعتیاد زنان را از مهمترین مسائل اجتماعی جهان امروز و همچنین یکی از عوامل تأثیرگذار بر بسیاری از آسیب‌های اجتماعی تلقی کرد.^(۲)

یکی از متغیرهایی که اعتیاد زنان بر آن تأثیر مخرب می‌گذارد، سلامت روانی می‌باشد. مفهوم سلامت روان، جنبه‌ای از مفهوم کلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است که علی‌رغم تلاش‌هایی که از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به‌منظور تامین هر چه بیشتر سلامتی انسان‌ها به عمل آمده است، هنوز معیار قاطعی در زمینه تعریف و مصداق کامل سلامت روانی در افراد وجود ندارد. برخی چنین تصویر می‌کنند که نقطه مقابل سلامت روان، بیماری روانی است؛ در حالی که سلامت روان یعنی در آرامش بودن با خود و دیگران.^(۳)

از نظرشنیسر معیارهای سلامت روان عبارتند از : ۱-معیار فعالیت ذهنی: بررسی‌های به عمل آمده نشان داده است که افراد نوروتیک و شخصیت‌های ناسالم فعالیت ذهنی مناسبی ندارند. بنابراین، این معیار می‌تواند برای تمیز افراد سالم از ناسالم به‌کار گرفته شود. ۲-معیار کنترل وحدت فکر و عمل: کنترل موثر یکی از مهمترین نشانه‌های شخصیت سالم می‌باشد و ویژگی وحدت فکر و عمل که معمولاً به عنوان وحدت شخصیت از آن نام برده می‌شود چیزی است که غالباً افراد ناسالم فاقد آن هستند. ۳-احساسات و عواطف سالم و مناسب: احساساتی مانند عدم امنیت، خشم، ناشایستگی، حسادت، حقارت و گناه، از نشانه‌های بی‌نظمی روانی است. داشتن این‌گونه احساسات نشانه قابل ملاحظه‌ای برای تشخیص بیماری روانی است. ۴-آسایش و آرامش خاطر: داشتن این خصوصیت از نشانه‌های بارز سلامت روان تلقی می‌شود. افرادی که از نظر روانی ناسالم می‌باشند معمولاً نمی‌توانند آرامش و آسایش را در زندگی تجربه نمایند، این افراد همواره خود را در معرض انواع نگرانی‌ها و ناراحتی‌ها می‌یابند و وجودی خالی از آرامش دارند. ۵-نگرش‌های سالم: داشتن سلامت روان و برخورداری از روحیه و روان سالم مستلزم داشتن نگرش‌های سالم می‌باشد. نگرش‌هایی از قبیل دشمنی، تعصب بی‌جا، پیش‌داوری و نامیدی نمی‌تواند در کنار سلامت روان قرار گیرد. ۶-تصور مناسب از خویشتن: شکی نیست که سلامت روان بستگی عمیقی به این خصوصیت دارد. چنانچه فردی مفهوم و تصور صحیحی از خود نداشته باشد، زمینه‌ساز مشکلات دیگر خواهد بود. ۷-هویت فردی: فرد سالم از نظر روانی هویت شکل یافته و مناسبی دارد و می‌داند که چه کسی است و چه هدفی دارد. ۸-ارتباط کافی با واقعیت: فردی که با واقعیت رابطه ندارد از سلامت روان به دور خواهد بود. افراد سالم واقعیت را می‌پذیرند و همواره با آن زندگی می‌کنند.^(۴)

علیمرادی در تحقیقی تفاوت معناداری بین سلامت روان افراد معتاد و افراد غیر معتاد یافت که معتادان سلامت روانی کمتری نسبت به گروه سالم دارا بودند.^(۵) در پژوهشی که حسینی فربروی پانصد و بیست نفر مرد انجام داد به این نتیجه رسید که دو گروه معتادان و افراد سالم از لحاظ متغیرهای کیفیت زندگی و سلامت روان با هم تفاوت معناداری دارند و معتادان از سلامت روان پایین‌تری نسبت به افراد سالم برخوردارند. وی افزود معتادان در شرایط خطرناکی زندگی می‌کنند و نیازمند حمایت و کمک بیشتری هستند.^(۶)

سلامت روان که حالتی از سلامتی عاطفی و اجتماعی است، به علت اثرگذاری بر وضعیت و سلامت جسمانی مقوله‌ای بسیار حائز اهمیت بهشمار می‌آید. سلامت روان در واقع منبعی است که افراد را قادر می‌سازد زندگی خود را به شکل موفقیت آمیزتری اداره نمایند. عوامل متعدد محیطی، اجتماعی و جسمی بر وضعیت سلامت روان اثر می‌گذارد؛ یکی از این عوامل حمایت اجتماعی است.^(۷) برخی از پژوهشگران، حمایت اجتماعی را میزان برخورداری از محبت، همراهی، مراقبت، احترام، توجه و کمک دریافت شده توسط فرد از سوی افراد یا گروه‌های دیگر نظری اعضای خانواده، دوستان و دیگران مهم تعریف کرده‌اند.^(۸) ساراسون حمایت اجتماعی را دارای ابعاد پنج‌گانه می‌داند: ۱-حمایت

تضاد در نوجوانان الکلی و پدران غیرالآلکلی عنوان کردند، حمایت اجتماعی بالا همچنین حمایت بالای والدین با سلامت روان بهتر و احتمال کم شروع مصرف مواد در نوجوانان مرتبط است.^(۱۴) طبیعی، ابوالقاسمی، محمود علیلو در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که معتادان نسبت به افراد بهنگار از حمایت اجتماعی کمتری نسبت به افراد عادی برخوردارند و همچنین از محرومیت اجتماعی چندگانه‌ای رنج می‌برند.^(۱۵) جرج به این نکته اشاره نمود که فراهم کردن حمایت اجتماعی به میزان کافی، اثرات مستقیم قابل توجهی روی سلامت روان دارد، به طوری که سطوح حمایت اجتماعی با میزان پایین تر اختلال روانی همراه است.^(۱۶) بر اساس مطالعات، زمینه ظهور مفهوم حمایت اجتماعی و مطرح شدن آن به عنوان متغیر اصلی در تحقیقات گوناگون مرتبط با سلامت، نشان دهنده برداشتن گامی جدی در بررسی نقش عوامل اجتماعی بر سلامت روان می‌باشد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان زنان معتاد می‌باشد.

عاطفی: داشتن مهارت لازم در کمک گرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواری‌ها. ۲-**حمایت شبکه اجتماعی:** به معنای دسترسی و عضویت در شبکه‌های اجتماعی. ۳-**حمایت خود ارزشمندی:** اینکه دیگران در دشواری‌ها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که او فردی ارزشمند است و می‌تواند با به کارگیری توانایی‌های ویژه خود بر دشواری‌ها چیره شود. ۴-**حمایت ابزاری:** دسترسی داشتن به منابع مالی و خدماتی در سختی‌ها و دشواری‌ها. ۵-**حمایت اطلاعاتی:** بتواند اطلاعات موردنیاز خود را برای درک موقعیت به دست آورد. ۶-**بعاد حمایت اجتماعی به عنوان قویترین و نیرومندترین نیروهای مقابله‌ای برای رویارویی موققت آمیز و آسان افراد در زمان درگیری با شرایط تنفس‌زا می‌باشد که تحمل مشکلات را برای فرد تسهیل می‌نماید.^(۱۰) میزان حمایت اجتماعی هم در آسیب‌پذیری و هم در مقابله افراد نسبت به تنفس دارد. آسیب‌پذیری جسمی و روان شناختی به موازات کاهش حمایت اجتماعی افزایش می‌یابد، به این معنا که حمایت اجتماعی به عنوان سپری در مقابل آشتگی‌های زندگی در دنیای پیچیده کنونی عمل می‌کند. حمایت اجتماعی نه تنها طی دوره فشار روانی بسیار یاری کننده است، بلکه در موقع آرامش نسبی نیز مفید می‌باشد.^(۱۱) ۷-**حمایت اجتماعی مانند یک سپر در برابر آسیب‌های روانی و جسمانی و استرس‌های زندگی عمل می‌کند.** از این رو می‌توان انتظار داشت سطح بهینه حمایت اجتماعی با افزایش سطح سلامت روان ارتباط داشته است.^(۱۲) واژرمن در پژوهشی به این نتیجه رسید. حمایت اجتماعی بالا با پرهیز از مصرف کوکائین در بیماران تحت درمان نگهدارنده مواد مخدر (OMT) ارتباط دارد.^(۱۳) بارها، چاسین و روگوچ در مطالعه‌ای با عنوان اثر حمایت اجتماعی و**

روش

روش مورد استفاده این پژوهش برای ارزیابی رابطه بین مولفه‌های حمایت اجتماعی بر سلامت روان، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان معتاد مراجعت کننده به کمپ‌های تحت نظر سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر شهر تهران در فروردین سال ۱۳۹۵ (شامل کمپ مرهم واقع در تهرانسر، کمپ بهبود گستران همگام واقع در ورد آورد و موسسه خیریه کوثر واقع در شهریار) تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس صد و پنجاه نفر به دست آمد.

ملاحظات اخلاقی پژوهش: ۱- کلیه پاسخ دهنده‌ها به صورت کتبی و شفاهی اطلاعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل در پژوهش مشارکت می‌نمودند. ۲- این اطمینان به آزمودنی‌ها داده شد که تمام اطلاعات محرومانه هستند و برای امور پژوهشی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ۳- به منظور رعایت حریم خصوصی، نام و نام خانوادگی شرکت‌کنندگان ثبت نشد. ۴- برای اطمینان از روند کار، کلیه پرسشنامه‌ها توسط خود پژوهشگر اجرا شد.

ابزار پژوهش

۱- پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ): این ابزار توسط گلدبرگ و هیلیر (۱۹۷۹) به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانی ساخته شده است. این یک پرسشنامه سرندي مبتنی بر روش خودگزارش دهی است که هدف از آن، دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری‌های روانی نیست بلکه منظور اصلی آن ایجاد تمايز بین بیماری

۲-مقیاس حمایت اجتماعی: این مقیاس توسط فلمنگ، باوم، گاسریل و گچل (۱۹۸۲) ساخته شده است. این مقیاس بیست و پنج سوال دارد که برای ارزیابی چهار خرده مقیاس به کار می رود که عبارتند از:

حمایت ادراک شده از خانواده، حمایت ادراک شده از دوستان، نظر و عقیده درباره اهمیت حمایت اجتماعی، حمایت ادراک شده عمومی یا کلی.

در پژوهش شهیاد (۱۳۸۸) اعتبار مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده از طریق محاسبه آلفای کرونباخ برآورد گردید که برابر با ۰/۶۸ بود و در هر یک از خرده مقیاس های دوستان، همکلاسی ها، خانواده، حمایت کلی به ترتیب ۰/۶۷، ۰/۸۴، ۰/۸۱ و ۰/۵۵ به دست آمد.^(۱۹) در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی این مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۵ به دست آمد.

سلامت است. این پرسشنامه بیست و هشت سوال دارد که برای ارزیابی چهار خرده مقیاس به کار می رود که عبارتند از: علایم جسمانی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی، افسردگی.

یعقوبی ضریب پایایی کلی این پرسشنامه را ۰/۸۸ و ضریب پایایی خرده آزمون ها را بین ۰/۵۰ تا ۰/۸۱ گزارش کرده است.^(۱۷)

میزان اعتبار این پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۰/۸۲ گزارش شده است.^(۱۸) در پژوهش حاضر نیز میزان پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰/۹۳ به دست آمد.

نتایج

طبق بررسی داده های پژوهش، میانگین متغیر حمایت اجتماعی در افراد نمونه، ۱۳/۷۹ با انحراف معیار، ۵/۷۶ و سلامت روان، ۱۶/۶۲ با انحراف معیار، ۰/۹۶ ارزیابی شده است. برای بررسی نرمال بودن نمرات از آزمون های کولومگراف-اسمیرنف و شاپیرو-ویلک استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون گولموگراف-اسمیرنف چون مقادیر به دست آمده برای این آزمون در سطح ۰/۰۵ معنادار نیست، بنابراین شرط توزیع نرمال بودن داده ها برقرار است و می توان از آزمون پارامتریک برای بررسی فرضیه های پژوهش استفاده نمود. برای بررسی فرضیه های پژوهشی ابتدا با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه ساده بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای تعیین نقش مولفه ها از رگرسیون چندگانه استفاده شد.

با توجه به داده های جدول شماره یک، چون مقدار ۳۸۲/- در رابطه بین حمایت اجتماعی با سلامت روان در سطح ۰/۰۱ معنادار است، بنابراین فرضیه اصلی پژوهش تایید می گردد. به عبارت دیگر بین حمایت اجتماعی با نمرات سلامت روان رابطه معناداری به صورت منفی و معکوس وجود دارد. هر چه حمایت اجتماعی بیشتر باشد، بر میزان سلامت روان (نمرات پایین در این مقیاس به معنی بالا بودن سلامت روان می باشد) افزوده می شود و بالعکس. بنابراین بین حمایت اجتماعی با سلامت روان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد، بین ابعاد "حمایت اجتماعی از طرف دوستان و عقیده و نظر درباره حمایت اجتماعی ادراک شده" با سلامت روان نیز رابطه معنادار به صورت منفی و معکوس وجود دارد.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که رگرسیون مولفه سلامت روان از روی ابعاد حمایت اجتماعی، در سطح ۰/۰۰۰ معنادار است.^(P<۰/۰۰۰، F=۹/۷۵۶) بنابراین قدرت پیش بینی مولفه سلامت روان از روی ابعاد حمایت اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است. و این مولفه ها بخشی از واریانس سلامت روان را تبیین می کند. به عبارت دیگر این نتیجه نشان می دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است.

بین حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد علایم جسمانی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که رگرسیون مولفه سلامت روان در بعد علایم جسمانی از روی ابعاد حمایت اجتماعی، در سطح ۰/۰۰۰ معنادار است.^(P<۰/۰۰۰، F=۶/۸۱۹) بنابراین قدرت پیش بینی مولفه سلامت روان در بعد علایم جسمانی از روی ابعاد حمایت اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است. لذا این مولفه ها بخشی از واریانس سلامت روان در بعد علایم جسمانی را تبیین می کند. به عبارت دیگر این نتیجه نشان می دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است.

بررسی رابطه حمایت اجتماعی با سلامت روان زنان معتاد

با توجه به میزان^۲ موجود در جدول شماره دو، می‌توان نتیجه گرفت که مولفه حمایت اجتماعی در مدل ارایه شده در حدود ۱۵/۸ در صد از واریانس متغیر سلامت روان در بعد علایم جسمانی را تبیین می‌کند. مقدار بتا در مدل ارایه شده نشان دهنده میزان تبیین واریانس متغیرهای پیش‌بین روی ملاک است. بر اساس همین ضرایب استاندار بتا، بیشترین نقش و تبیین روی سلامت روان در بعد علایم جسمانی بر عهده حمایت اجتماعی از طرف دوستان می‌باشد؛ به طوری که با هر واحد تغییر در حمایت اجتماعی از طرف دوستان به اندازه ۰/۳۲۸ در واریانس نمره سلامت روان در بعد علایم جسمانی تغییر ایجاد می‌گردد.

بین حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد اضطراب رابطه معنادار وجود دارد.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که رگرسیون مولفه سلامت روان در بعد اضطراب از روی ابعاد حمایت اجتماعی، در سطح ۰/۰۰۱ معنادار است. ($P=0/001$, $F=5/267$) بنابراین قدرت پیش‌بینی مولفه سلامت روان در بعد اضطراب از روی ابعاد حمایت اجتماعی از لحظ آماری معنادار است. و این مولفه‌ها بخشی از واریانس سلامت روان در بعد اضطراب را تبیین می‌کند. به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‌دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است. به عبارت دیگر بین ابعاد حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد اضطراب رابطه معنادار وجود دارد.

با توجه به میزان^۲ موجود در جدول شماره سه، می‌توان نتیجه گرفت که مولفه حمایت اجتماعی در مدل ارایه شده حدود ۱۲/۵٪ از واریانس متغیر سلامت روان در بعد اضطراب را تبیین می‌کند. مقدار بتا در مدل ارایه شده نشان دهنده میزان تبیین واریانس متغیرهای پیش‌بین روی ملاک است. بر اساس همین ضرایب استاندار بتا بیشترین نقش و تبیین روی سلامت روان

جدول(۱) نتایج ضرایب همبستگی پرسون در مورد رابطه فرضیه اصلی						
۶	۵	۴	۳	۲	۱	متغیر
					۱	خانواده
				۱	۰/۱۷۳	دوستان
			۱	۰/۴۷۴	۰/۴۹۲	حمایت اجتماعی
		۱	۰/۱۴۸	۰/۱۱۲	۰/۲۰۱	نظر و عقیده
	۱	۰/۰۴۶	۰/۰۷۷۲	۰/۰۶۸۰	۰/۰/۷۷۶	عمومی یا کلی
	۱	۰/۰۳۸۲	۰/۰۳۴۷	۰/۰۴۲۴	-۰/۱۴۳	کل
	۱	-۰/۱۱۱	۰/۰۳۴۷	-۰/۰۴۲۴	-۰/۰۳۴۷	سلامت روان
						* معناداری در سطح ۰/۰۱
						** معناداری در سطح ۰/۰۵

جدول(۲) نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه سلامت روان در بعد علایم جسمانی از روی ابعاد حمایت اجتماعی						
sig	t	ضرایب استاندار بتا	ضرایب خطا ضرایب	ضرایب غیر استاندار	پیش‌بین	متغیر ملاک
۰/۰۰۰	۷/۲۵۸			۱/۳۹۱	۱۰/۰۹۳	اثر ثابت
۰/۲۶۲	-۱/۱۲۶	-۰/۱۰۰	۰/۱۵۵	-۰/۱۷۵	خانواده	حمایت اجتماعی
۰/۰۰۰	-۳/۷۶۹	-۰/۳۲۸	۰/۱۸۳	-۰/۶۹۰	دوستان	
۰/۴۷۲	-۰/۷۲۱	-۰/۰۷۱	۰/۳۲۰	-۰/۳۳۰	نظر و عقیده	
۰/۳۷۱	۰/۸۹۷	۰/۰۷۰	۰/۳۳۶	۰/۳۰۱	عمومی یا کلی	
	۰/۱۵۸	R ^۲		۰/۳۹۸	R	
						مدل

جدول(۳) نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه سلامت روان در بعد اضطراب از روی ابعاد حمایت اجتماعی						
sig	t	ضرایب استاندار بتا	ضرایب خطا ضرایب	ضرایب غیر استاندار	پیش‌بین	متغیر ملاک
۰/۰۰۰	۷/۴۰۴			۱/۳۲۷	۹/۸۲۴	اثر ثابت
۰/۷۴۶	-۰/۳۲۵	-۰/۰۲۹	۰/۱۴۸	-۰/۰۴۸	خانواده	حمایت اجتماعی
۰/۰۴۰	-۲/۰۷۰	-۰/۱۸۳	۰/۱۷۵	-۰/۳۶۲	دوستان	
۰/۰۳۰	-۲/۱۹۸	-۰/۰۲۰	۰/۰۳۰	-۰/۰۶۷۰	نظر و عقیده	
۰/۷۲۳	۰/۳۴۲	۰/۰۲۷	۰/۰۲۱	۰/۱۱۰	عمومی یا کلی	
	۰/۱۲۵	R ^۲		۰/۳۵۶	R	
						مدل

جدول(۴) نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه سلامت روان در بعد اختلال عملکرد اجتماعی از روی ابعاد حمایت اجتماعی						
sig	t	ضرایب استاندار بتا	ضرایب خطا ضرایب	ضرایب غیر استاندار	پیش‌بین	متغیر ملاک
۰/۰۰۰	۱۰/۸۱۰			۱/۰۲۵	۱۱/۰۸۵	اثر ثابت
۰/۱۳۳	۱/۰۵۹	۰/۱۳۵	۰/۱۱۵	۰/۱۷۳	خانواده	حمایت اجتماعی
۰/۰۰۴	-۲/۹۳۱	-۰/۰۲۵	۰/۱۳۵	-۰/۳۹۶	دوستان	
۰/۱۸۵	-۱/۳۳۳	-۰/۰۱۲	۰/۰۲۳۶	-۰/۰۳۱۴	نظر و عقیده	
۰/۰۱۷	-۲/۴۴۲	-۰/۰۱۹۰	۰/۰۲۴۸	-۰/۰۶۰۰	عمومی یا کلی	
	۰/۱۸۴	R ^۲		۰/۳۸۵	R	
						مدل

جدول(۵) نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه سلامت روان در بعد افسردگی از روی ابعاد حمایت اجتماعی						
sig	t	ضرایب استاندار بتا	ضرایب خطا ضرایب	ضرایب غیر استاندار	پیش‌بین	متغیر ملاک
۰/۰۰۰	۸/۱۹۳			۱/۵۳۵	۱۲/۵۷۳	اثر ثابت
۰/۲۸۸	۱/۰۶۶	۰/۰۹۱	۰/۱۷۱	۰/۱۸۳	خانواده	حمایت اجتماعی
۰/۰۰۰	-۳/۷۰۳	-۰/۰۳۱۱	۰/۰۲۰	-۰/۷۴۸	دوستان	
۰/۰۳۳	-۲/۱۵۸	-۰/۰۲۰	۰/۰۳۵۳	-۰/۰۷۶۱	نظر و عقیده	
۰/۰۴۰	-۲/۰۶۷	-۰/۰۱۵۶	۰/۰۳۷۱	-۰/۰۷۶۷	عمومی یا کلی	
						مدل

تبیین می‌کند. مقدار بتا در مدل ارایه شده نشان دهنده میزان تبیین واریانس متغیرهای پیش‌بین روی ملاک است. بر اساس همین ضرایب استاندار بتا، بیشترین نقش و تبیین روی سلامت روان در بعد اختلال عملکرد اجتماعی بر عهده بعد حمایت اجتماعی از طرف دوستان می‌باشد؛ به طوری که با هر واحد تغییر بعد حمایت اجتماعی از طرف دوستان به اندازه 0.256 در واریانس نمره سلامت روان در بعد اختلال عملکرد اجتماعی تغییر ایجاد می‌گردد. بین حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد افسردگی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که رگرسیون مولفه سلامت روان در بعد افسردگی از روی ابعاد حمایت اجتماعی، در سطح 0.000 معنادار است. ($F=10.064$, $P<0.000$) بنابراین قدرت پیش‌بینی مولفه سلامت روان در بعد افسردگی از روی ابعاد حمایت اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است. این مولفه‌ها بخشی از واریانس سلامت روان در بعد افسردگی را تبیین می‌کند، این نتیجه نشان می‌دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است. به عبارت دیگر بین ابعاد حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد افسردگی رابطه معنادار از لحاظ آماری وجود دارد.

با توجه به میزان R^2 موجود در جدول شماره پنج، می‌توان نتیجه گرفت که مولفه حمایت اجتماعی در مدل ارایه شده در حدود 21.7% از واریانس متغیر سلامت روان را در بعد افسردگی تبیین می‌کند. مقدار بتا در مدل ارایه شده نشان دهنده میزان تبیین واریانس متغیرهای پیش‌بین روی ملاک است. بر اساس همین ضرایب استاندار بتا بیشترین نقش و تبیین روی سلامت روان در بعد افسردگی بر عهده بعد حمایت اجتماعی از طرف دوستان می‌باشد؛ به طوری که با هر واحد تغییر بعد حمایت اجتماعی از طرف دوستان به اندازه 0.311 در واریانس نمره سلامت روان در بعد افسردگی تغییر ایجاد می‌گردد. بعد نظر و عقیده درباره اهمیت حمایت اجتماعی و حمایت اجتماعی عمومی و کلی نیز به میزان 0.204 و 0.156 در تبیین واریانس سلامت روان در بعد افسردگی نقش معناداری دارد.

در بعد اضطراب بر عهده بعد نظر و عقیده درباره اهمیت حمایت اجتماعی می‌باشد؛ به طوری که با هر واحد تغییر در بعد نظر و عقیده درباره اهمیت حمایت اجتماعی به اندازه 0.220 در واریانس نمره سلامت روان در بعد اضطراب تغییر ایجاد می‌گردد. بعد حمایت اجتماعی از طرف دوستان نیز به میزان 0.183 در تبیین واریانس سلامت روان در بعد اضطراب نقش معناداری دارد. بین حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد اختلال عملکرد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که رگرسیون مولفه سلامت روان در بعد احتلال عملکرد اجتماعی از روی ابعاد حمایت اجتماعی، در سطح 0.000 معنادار است. ($F=6.302$, $P<0.000$) بنابراین قدرت پیش‌بینی مولفه سلامت روان از روی ابعاد حمایت اجتماعی از لحاظ آماری معنادار است. و این مولفه‌ها بخشی از واریانس سلامت روان در بعد احتلال عملکرد اجتماعی را تبیین می‌کند.

به عبارت دیگر این نتیجه نشان می‌دهد که ضرایب رگرسیون معنادار است. به عبارت دیگر بین ابعاد حمایت اجتماعی با سلامت روان در بعد اختلال عملکرد اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

با توجه به میزان R^2 موجود در جدول شماره چهار، می‌توان نتیجه گرفت که مولفه حمایت اجتماعی در مدل ارایه شده در حدود 18.4% از واریانس متغیر سلامت روان در بعد اختلال عملکرد اجتماعی را

بحث و نتیجه نتیجه

نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین حمایت اجتماعی با مولفه‌های سلامت روان زنان معنادار رابطه معناداری وجود دارد. این یافته‌ها با نتایج پژوهش هاشمی، محمدزادگان، قاسم بکلو، ایرانی و وکیلی (۱۳۹۳) همسو می‌باشد. بر اساس یافته‌های حاصل از پژوهش آنان، بین افراد وابسته به مواد و جمعیت سالم از لحاظ سلامت عمومی و مولفه‌های آن (نشانگان جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی) تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین

کرده و پژوهشگران را در اتخاذ تدابیر موثر یاری دهد. اجرای این پژوهش در فروردين سال ۱۳۹۵ بر روی ۱۵۰ نفر از زنان معتاد کمپ های تحت نظارت سازمان بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر شهر تهران که قابلیت تعیین نتایج را محدودی کند، عدم همکاری بعضی از افراد شرکت کننده برای تکمیل پرسشنامه، عدم دسترسی به منابع کافی و کمبود تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع از محدودیت های پژوهش است.

نتایج پژوهش نشان داد که بین حمایت اجتماعی و سلامت روانی زنان معتاد رابطه وجود دارد. لذا، یافته های این پژوهش می تواند در اختیار مدد کاران اجتماعی، مشاوران روان شناسان قرار بگیرد تا با آگاهی هر چه بیشتر از اهمیت مولفه های روان شناختی همچون حمایت اجتماعی و سلامت روان به زنان معتاد در زمینه ترک اعتیاد کمک کنند. همچنین، با برگزاری کارگاه های آموزشی و طراحی مداخله های لازم روانی اجتماعی با تأکید بر سلامت روان و حمایت اجتماعی به بهبود کیفیت زندگی آنها کمک کنند.

تشکر و قدردانی: این پژوهش با حمایت مالی و معنوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده است. نویسنده گان از این کمیته و همچنین شرکت کنندگان محترم در پژوهش که ما را در انجام و به ثمر رساندن این پژوهش یاری رساندند، کمال تشکر و قدردانی را دارند.

بین افراد وابسته به مواد و جمعیت سالم از لحاظ حمایت اجتماعی و مولفه های آن (حمایت ادراک شده از خانواده، حمایت ادراک شده از دوستان، نظر و عقیده درباره حمایت اجتماعی و حمایت عمومی) تفاوت معنادار وجود دارد. (۲۰) در کل یافته های تحقیق نشان داد که معتادان از سلامت روان و حمایت اجتماعی کمتری نسبت به افراد سالم برخوردارند. همچنین مطالعه آسایش، حسام، قربانی و شریعتی (۱۳۹۳) نیز نشان داد که حمایت اجتماعی از سوی اعضای خانواده، سبب ارتقای سلامت روان و رضایت از زندگی و در نتیجه باعث کاهش مشکلات روانی می شود. (۲۱) از نتایج این پژوهش و پژوهش های پیشین چنین بر می آید که زنان معتاد در مرحله اول، افراد معتاد از بعد روان بوده و نیاز به مشاوره، حمایت و درمان دارند. محبوس کردن، دور نگه داشتن از جامعه و تنبیه، درمان یک فرد معتاد نیست چرا که راه های فوق نه تنها مشکلات و دردهای یک معتاد را التیام نمی بخشد بلکه منجر به گسترش ناهنجاری ها و اختلالات روانی فرد معتاد می شود و طبعاً گرایش برای مراجعه مجدد به مواد مخدر را افزایش می دهد. اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می شود.

با توجه به اینکه اعتیاد زنان پیامدها و عواقب جدی از قبیل طرد شدن، تاثیر منفی روی فرزندان، کاهش روابط اجتماعی عادی و افزایش ارتباط با معتادین را به همراه دارد و از آن جایی که زنان وظیفه مادری و تربیت نسل آینده را بر عهده دارند و وجود مادر معتاد در خانواده می تواند به همسر، فرزندان و جامعه آسیب جدی وارد کند. لذا لازم است همواره نیازهای حمایتی زنان معتاد مورد بررسی قرار گرفته و با بسیج منابع حمایتی موجود در جامعه و مشارکت سازمان ها در جهت ارتقاء سلامت روانی- اجتماعی و حمایت اجتماعی از آن ها اقدامات موثر انجام شود. این پژوهش با محدودیت هایی روبرو بود که بیان آنها می تواند یافته ها و پیشنهادهای پژوهش را تصریح

نتایج

References:

- 1- Aram, S., Ghofrani, Mohsen Salehi Kia, A. (2016). Ten weeks of aerobic training effect with vitamin E supplementation on blood pressure, heart rate and maximal oxygen uptake in women drug users. the monthly Journal of fayez. 20(1), 16-48.[Persian]
- 2-Kakouei Dinaki, E., & Ghavami, N. (2015). The Study of Gender and Women consequences of drug abuse trends. Social Health and Addiction Journal, 1(4), 9-32. [Persian]
- 3-Khaza'i,O., Khaza'i, F., & Alizadeh Mousavi, E. (2012). The relationship between early maladaptive schemas and meta cognitive beliefs and mental health addicted women. New findings in the Proceedings of the International Conference on Research in Psychology, Counselling and Education (1-9). Righteous institution of higher education. Tehran. [Persian]
- 4- Mohamadmoradi, B. (1388). Review and compare marital satisfaction and mental health among women

- in Kermanshah province with an emphasis to issues Oramanat culture in the region. Master's degree, field of Counseling, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
- 5- Alimoradi, L. (2011). The Comparing Activity Of Brain Behavioral Systems And Mental Health In Normal And Addicts Individuals. Journal Of Procedia-Social And Behavioral Sciences, 30,170-1708. [Persian]
- 6- Hoseinifar, J., & Et Al. (2011). Comparison Of Guilty Of Life And Mental Health Of Addicts And Non-Addicts , Journal Of Procedia – Social And Behavioral Sciences, 30, 1930-1934. [Persian]
- 7-Nazeri joybari, Z. (2012). The effect of social support on the mental health hospital medical team in the Mazandaran province. Master's degree, Social Work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabaei University, Tehran. [Persian]
- 8- Sarafino, E. P. (1998). Health Psychology, Third Edition, Newyork, John Wiley & Sons.
- 9- Kaldi, A., & Salahshori, P. (1391). The effect of social support on women's empowerment, social Journal of Development Studies, 4, 7-23. [Persian]
- 10-Lee, J., Pomeroy, E. C., & Bohman, T. M. (2009). Intimate partner violence and psychological health in a sample of Asian and Caucasian women: The roles of social support and coping. Journal of Family Violence, 22.
- 11-Cotrona, C.E. (2007). Objective determinants of perceived social support. Journal of personality and social psychology, 50.
- 12-Sotodeh navroodi ,O., Zeinali, Sh., & Khasteganan, N. (2012). The relationship between violence, social support and perceived stress in women and non-addict with addicted husbands in Rasht. Nursing and Midwifery, 22(68), 25-32. [Persian]
- 13- Wasserman , D.A. & Et Al. (2001). Social Support And Abstinence From Opiates And Cocaine During Opioid Maintenance Treatment. Journal Of Drug And Alcohol Dependence ,65.64-75.
- 14- Barerra, M., Chassin, L., & Rogosch, F. (1993). Effects Of Social Support And Conflict On Adolescent Children Of Alcoholic And Nonalcoholic Fathers. Journal Of Personality And Social Psychology, 64, 602-612.
- 15- Taeibi, K., Abolghasemi, A., & Mahmoodaliloo, M. (1391). Compare advocacy and social exclusion and psychoactive drug addicts and normal individuals. Journal of Research in Applied Psychology, 12 (2). [Persian]
- 16-Peyravi, H., Hajebi, A., & Panaghi, L. (2010). The relationship between social support and mental health in students of Tehran University. Health System Research Journal. 69(2), 301-308. [Persian]
- 17-Gerami, M. (2013). Compare mental health and self-efficacy in people with and without experience child abuse. Master's degree, educational counseling psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
- 18-Geraat, M., Mohammadi, A. (2014). The relationship between perceived social support and mental health Transsexuals. Journal of Social Work, 3(2), 19-32. [Persian]
- 19-Faghihi, E. (2012). Its gender beliefs and perceived social support and different aspects of identity. Master's degree, field of General Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran. [Persian]
- 20-Hashemi, T., Mohmadzadegan, R., G. Bakelo, Y., Irani, M., & Vakili, S. (2014). Comparison of general health and social protection in substance dependent patients and healthy subjects. Atyadpzhvhy Journal of Substance Abuse, 8(31), 119-134. [Persian]
- 21-Asayesh, H., Hesam, M., Ghorbani, M., & Shariati, A. (2010). Relation of social support with mental health and consent of life in instance students. Journal science Gorgan Faculty of nursing and midwifery, 7(1), 15-20. [Persian]